




## BOR PLUS برپلاس

- جذب و حمل آسان در داخل گیاه
- رشد و توسعه مریستم گیاه
- افزایش متابولیسم کربوهیدراتها
- افزایش سنتز اسیدنوکلئیک
- افزایش گرده و جوانه‌زنی
- تنظیم و بهینه‌سازی مقدار آب مصرفی در سلولها



مواد تشکیل دهنده گارانتی شده  
| بر - - - - - %۱۰ |

این عنصر برای رشد نوک ساقه و ریشه (مریستم انتهایی) لازم و ضروری است. بر نقش عمده‌ای در فعالیت‌های حیاتی گیاه دارد و در تقسیم سلولی بافت‌ها، تشکیل جوانه‌های برگ و گل، ترمیم بافت‌های آوندی، متابولیسم قند و مواد هیدروکربن دار و انتقال آنها، تنظیم مقدار آب و هدایت آن در سلول، انتقال کلسیم در گیاه و تنظیم نسبت کلسیم به پتاسیم در بافت های گیاهی، متابولیسم چربی، سنتز پکتین و در تشکیل دیواره‌ی سلولی نقش بسزائی دارد.

علائم کمبود بر در گیاهان:

- بدفرمی ساختاری در برگ
- ترک خوردگی و پوسیدگی میوه‌ها
- کاهش رشد جانبی و تولید میوه و...
- علت کمبود بر در گیاهان:
- pH بالای خاک
- نرمی خاک
- وجود کلسیم و ازت بیش از حد در خاک
- خشک‌سالی بلندمدت
- رطوبت و سردی بیش از حد و...

## BOR PLUS

### برپلاس

استفاده از برگ در ۱۰۰ لیتر آب	استفاده از خاک در ۱۰۰۰ متر	زمان استفاده	نوع گیاه	
۲۵۰ - ۲۰۰ سی سی	۱ - ۲ لیتر	بعد از آغاز باردهی ۱۰ الی ۱۵ روز یک بار ۳ تا ۴ بار	گوجه فرنگی، خیار، فلفل	صیفی جات گلخانه ای
۲۵۰ - ۲۰۰ سی سی	۱ - ۲ لیتر	بعد از تشکیل میوه ۱۰ الی ۱۵ روز یک بار ۲ تا ۳ بار	خریزه، هنداونه	
۳۰۰ - ۲۰۰ سی سی	۱ - ۲ لیتر	بعد از گلدهی به فاصله ۷ الی ۱۵ روز یک بار ۲ تا ۳ بار تکرار	سیب، گلابی، گیلان، هلو	درختان میوه
۳۰۰ - ۲۰۰ سی سی	۱ - ۲ لیتر	از ۲ تا ۳ برگ شدن گیاهان به فاصله هر ۱۵ روز یک بار، ۲ تا ۳ بار	کاهو، تره فرنگی، هویج، کرفس، جعفری	سبزیجات فضای باز
۳۰۰ - ۲۰۰ سی سی	۱ - ۲ لیتر	بعد از گلدهی به فاصله ۷ الی ۱۵ روز یک بار ۲ تا ۳ بار تکرار	پرتقال، لیمو، نارنگی، کیوی	مرکبات
۱۰۰ سی سی	۱ - ۲ لیتر	بعد از تشکیل میوه ۱۰ الی ۱۵ روز یک بار ۲ تا ۳ بار		توت فرنگی
۲۰۰ سی سی	۱ - ۲ لیتر	در دوره باردهی به فاصله ۱۵ الی ۲۰ روز، ۲ تا ۳ بار		انگور
۳۰۰ - ۲۰۰ سی سی	۱ - ۲ لیتر	بعد از تشکیل میوه ۱۰ الی ۱۵ روز یک بار ۲ تا ۳ بار	آفتابگردان، گوجه فرنگی، لوبیا، ذرت، سیب زمینی، پیاز، چغندر قند	گیاهان فضای باز
۲۵۰ - ۲۰۰ سی سی	۱ - ۲ لیتر	بعد از تشکیل میوه و به همراه سموم مبارزه با علف هرز	گندم، جو	غله
۲۵۰ - ۲۰۰ سی سی	۱ - ۲ لیتر	قبل از برداشت و بعد از برداشت ۲ تا ۳ بار به فاصله ۱۵ الی ۲۰ روز		پسته